

Tabla resumen Vacunación COVID-19 para el otoño-invierno

Grupo	Primovacunación ^{1,2} (intervalo entre dosis)	Dosis de recuerdo para el otoño-invierno ³	Comentarios
≥12 años	<p>Dos dosis vacuna ARNm monoivalente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comirnaty 30µg/dosis (21 días) • Spikevax (28 días) <p>Dos dosis vacuna ARNm bivalente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comirnaty original/Omicron BA.4/5 (21 días) • Spikevax original/Omicron BA.1 (28 días) • Spikevax original/Omicron BA.4/5 (28 días) <p>Dos dosis de vacuna de proteínas⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> • VidPrevtyn Beta (21 días) <p>Cualquier combinación de dos dosis de las vacunas disponibles (ARNm monoivalente + ARNm bivalente, etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personas ≥60 años, personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad y aquellas con condiciones de riesgo • Convivientes con personas que tienen alto grado de inmunosupresión⁵ • Personal de centros, servicios y establecimientos sanitarios • Personas <60 años sin factores de riesgo que lo soliciten por razones administrativas o por otros motivos, no existiendo contraindicación <p>Una dosis vacuna (5 meses desde última dosis o infección⁶):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty vacuna original/Omicron BA.4/5 - Spikevax vacuna original/Omicron BA.1 - VidPrevtyn Beta⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • Se administrará la dosis de recuerdo de otoño-invierno en personas con primovacunación completa independientemente del nº dosis administradas

¹ Recomendaciones actuales de primovacunación frente a COVID-19. Para más información sobre recomendaciones anteriores de primovacunación consultar https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_EstrategiaVacunacionCOVID-19.htm.

² En caso de infección ver [tabla resumen de la vacunación frente a COVID-19](#).

³ Si infección reciente, la dosis de recuerdo se administrará a partir de 5 meses tras la última infección. Salvo en personas ≥80 años, residentes en centros de mayores y personas con alto grado de inmunosupresión*, que se administrará a partir de 3 meses tras la infección.

⁴ La vacuna VidPrevtyn está autorizada para ≥18 años, por lo que no se puede administrar en el grupo de edad de 12-17 años. No hay disponibilidad de Nuvaxovid en otoño-invierno.

⁵ Personas con alto grado de inmunosupresión: en general se refiere a trasplantados de progenitores hematopoyéticos, trasplantados de órgano sólido, fallo renal crónico, infección por VIH con bajo recuento de CD4 (< 200 cel/ml), algunas inmunodeficiencias primarias) y aquellas sometidos a ciertas terapias inmunosupresoras.

⁶ En personas ≥80 años, residentes en centros de mayores y personas con alto grado de inmunosupresión* la dosis de recuerdo se administrará a partir de 3 meses tras la infección.

Tabla Resumen Vacunación COVID-19 – Estrategia de vacunación COVID-19 para el otoño-invierno
23 febrero 2023

Grupo	Primovacunación ^{1,2} (intervalo entre dosis)	Dosis de recuerdo para el otoño-invierno ³	Comentarios
5-11 años	<p>Dos dosis vacuna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comirnaty bivalente original/BA.4-5 10µg/dosis (presentación pediátrica) (8 semanas)⁷ • Comirnaty 10µg/dosis (8 semanas) 	<ul style="list-style-type: none"> • En niños y niñas residentes en centros de discapacidad y/o aquellas con condiciones de riesgo • Una dosis vacuna Comirnaty bivalente original/BA.4-5 10µg/dosis (presentación pediátrica) 	
6-59 meses	<p>En población con condiciones con alto grado de inmunosupresión:</p> <p>4 dosis vacuna Comirnaty 3µg/dosis (0, 3, 8, 16 semanas)⁸</p>	No recomendada	<ul style="list-style-type: none"> • En caso que se cumplan 5 años entre cualquiera de las dosis, se completará la pauta con las vacunas recomendadas para población 5-11 años • En caso de infección por SARS-CoV-2, sintomática o asintomática, se iniciará o continuará la dosis que corresponda al menos 3 meses tras el diagnóstico, manteniendo los intervalos entre dosis especificados

⁷ La vacuna Spikevax también está autorizada para su uso en población infantil de 5 a 11 años, aunque la vacuna recomendada en este grupo de edad es Comirnaty 10 µg/dosis.

⁸ La vacuna Spikevax 25 µg/dosis también está autorizada para su uso en población infantil de 6 meses a 5 años (presentación 0,1 mg/ml), aunque no está disponible en España.

Condiciones de riesgo consideradas para la vacunación con dosis de recuerdo frente a COVID-19 para el otoño 2022

- Personas menores de 60 años de edad (ver límite inferior de edad en función de la considerada en la ficha técnica de las vacunas disponibles) con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.
- Personas menores de 60 años de edad (ver límite inferior de edad en función de la considerada en la ficha técnica de las vacunas disponibles) con:
 - o diabetes mellitus
 - o obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥ 40 en adultos, ≥ 35 en adolescentes o ≥ 3 DS en la infancia)
 - o enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico
 - o hemoglobinopatías y anemias
 - o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples
 - o asplenia o disfunción esplénica grave
 - o enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico
 - o enfermedades neuromusculares graves
 - o inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH, por fármacos – incluyendo tratamiento con eculizumab-, en los receptores de trasplantes y déficit de complemento).
 - o cáncer y hemopatías malignas
 - o implante coclear o en espera del mismo
 - o fístula de líquido cefalorraquídeo
 - o enfermedad celíaca
 - o enfermedad inflamatoria crónica
 - o trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. Se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.
- Personas institucionalizadas de manera prolongada.
- Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).
- Convivientes de personas con alto grado de inmunodepresión

Condiciones de riesgo consideradas para la vacunación en población infantil de 6 a 59 meses

- Trasplante de progenitores hematopoyéticos
- Trasplante de órgano sólido
- Fallo renal crónico
- Infección por VIH con bajo recuento de CD4
- Inmunodeficiencias primarias combinadas y de células B
- Tratamiento inmunosupresor con inmunomoduladores biológicos
- Cáncer de órgano sólido o hematológico en tratamiento con quimioterapia citotóxica u otros tratamientos que conlleven elevado riesgo de progresión a formas graves de COVID-19 (que requieran hospitalización o causen el fallecimiento)