

# ¡Forma parte de algo GRANDE!

## Resultados preliminares del estudio EMIS2017

Cinta Folch<sup>1,3</sup>, Percy Fernández-Dávila<sup>2</sup>, Asunción Díaz<sup>4</sup>, María C. Vázquez<sup>5</sup>, Sebastian Meyer<sup>2</sup>,  
Jordi Casabona<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT); <sup>2</sup> Área de Investigación, Stop Sida; <sup>3</sup> CIBERESP; <sup>4</sup> Centro Nacional de Epidemiología. Unidad de Vigilancia del VIH y Comportamientos de Riesgo <sup>5</sup> Secretaria del Plan Nacional sobre el sida; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

### Antecedentes/Objetivos

- El 54,3% de los nuevos diagnósticos de VIH notificados en España (2017) fueron en hombres que tienen sexo con hombres (HSH)<sup>1</sup>.
- Brotes recientes de ITS en el colectivo de hombres gay, bisexuales y otros HSH (GBHSH)<sup>2,3</sup>.
- Necesidad de información para conocer las **necesidades** del colectivo de hombres GBHSH frente al VIH y las ITS, y para poder **diseñar programas específicos** enfocados a darle respuesta.
- **Objetivo: Describir el perfil socio-demográfico y aspectos relacionados a la salud psico-socio-sexual en hombres GBHSH residentes en España.**

# Métodos

- **EMIS2017** fue realizado por Sigma Research (LSHTM), parte del proyecto **ESTICOM** ([www.esticom.eu](http://www.esticom.eu)), y financiado por el Programa de Salud de la UE 2014-2020.
- **Cuestionario online** (33 idiomas; en 50 países).
- En España, estuvo a cargo del **CEEISCAT** con la colaboración de **Stop Sida**, el **PNS** y el **CNE**.
- Desde **octubre 2017** a **Enero 2018** se recogió información sobre conductas sexuales, consumo de drogas, salud psicosocial, prueba del VIH/ITS, entre otras.
- Reclutamiento: principalmente en **apps** y **páginas de contacto gay**; también a través de ONGs, revistas digitales, Facebook, etc.



# Resultados (n=10.634)

Figura 1. Distribución de los participantes por CCAA




Figura 2. Número de parejas sexuales con las que tuvo sexo y/o penetración anal (últimos 12 meses)





Tabla 1. Características socio-demográficas de los participantes

	n	%
Edad media (DE)	35,2 (11,8)	
Nacido en otro país (inmigrante)*	2280	21,5
Más de 5 años de estudio después de los 16	6396	63,6
Ocupación actual: Empleado	6871	65,0
Identidad sexual: Gay u homosexual	8490	79,9


\*la mayoría procedía de América Latina (56,3%), seguido de Europa Occidental (30,6%).

- De los 10.075 participantes que tuvieron relaciones sexuales con hombres en los últimos 12 meses, el **81,6%** manifestó haber tenido algún tipo de sexo con una **pareja ocasional masculina**. Entre ellos, cerca del **40%** tuvo más de 10 parejas sexuales ocasionales en el último año (Figura 2).

Figura 3. Frecuencia del uso del preservativo en participantes que han realizado la penetración con pareja/s ocasional/es masculina/s (n=7.273)




**Figura 4. Uso sexualizado de drogas (últimos 12 meses)**



- Entre los que se habían realizado el test del VIH alguna vez (n=8.519), el **16,5%** declaró haber sido **diagnosticado del VIH**.
- La **prevalencia de alguna ITS** auto-declarada (sífilis, gonorrea, clamidia/LGV, condilomas o VHC) en los últimos 12 meses fue de **15,2%**.
- Entre los no diagnosticados de VIH (n=9.209), un **1,8%** estaban tomando la **PrEP**.

\* Uso sexualizado de drogas (Últimas 4 semanas)

0 - ≤ 4.7
≥ 4.8 - ≤ 8.8
≥ 8.9



**Tabla 2. Intimidación y ataques homofóbicos (alguna vez y últimos 12 meses)\***

	Alguna vez %	Últimos 12 meses %
Le miraron fijamente o se sintió intimidado	63,1	34,3
Recibió insultos verbales	63,0	19,4
Recibió un puñetazo, le atacaron, golpearon	16,7	2,0

\* por alguien que sabía o creía saber que se sentía atraído por hombres


\* *Uso de drogas estimulantes (éxtasis/MDMA, cocaína, speed, metanfetamina, mefedrona y ketamina) para hacer que el sexo fuera más intenso o que durara más tiempo. Solamente se calculó el indicador para CCAA con más de 100 participantes.*

\* Uso sexualizado de drogas (Últimas 4 semanas)

0 - ≤ 4.7

≥ 4.8 - ≤ 8.8

≥ 8.9



\* *Uso de drogas estimulantes (éxtasis/MDMA, cocaína, speed, metanfetamina, mefedrona y ketamina) para hacer que el sexo fuera más intenso o que durara más tiempo. Solamente se calculó el indicador para CCAA con más de 100 participantes.*

# Conclusiones/recomendaciones

- La información de EMIS2017 permitirá describir el nivel y distribución de los **determinantes de transmisión** del VIH e ITS en HSH, así como las **necesidades de prevención** y por tanto disponer de información clave que permita mejorar el diseño de las **intervenciones preventivas multinivel** dirigidas a esta población.
- El bajo uso del **preservativo**, el alto **consumo sexualizado de drogas**, pero también **otros factores estructurales** como la homofobia social, en nuestro contexto continúan siendo elementos clave que deben de considerarse conjuntamente para que estas estrategias sean realmente efectivas.
- Adaptar las intervenciones a **nivel local**, e implicar a las entidades de base comunitaria

## Agradecimientos:

- Todos los hombres GBHSH que participaron en EMIS2017
- Coordinadores de EMIS2017: Ford Hickson, David Reid, Axel J. Schmidt y Peter Weatherburn (Sigma Research (LSHTM))
- PlanetRomeo, European AIDS Treatment Group (EATG), Eurasian Coalition on Male Health (ECOM), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction (EMCDDA), European Commission (DG SANTE).
- Ana Celly por la elaboración del mapa.

### Páginas web/apps:

 BakaLa.org

 TUAMO.NET

### Revistas digitales:

 dosmanzanas.com

 EL RUMOR

 Loottis

 Play Ground

### Federaciones y ONGs LGBT/VIH:

 FELGTB  
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transversales y Bisexuales

 gt 20 años  
grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH (gt1-VIH)  
del CSIC de Barcelona y Fundación Triángulo

 GGM

 Gaispositius

 adhara

 H2O  
Col·lectiu Gai, Lesbà, Bisexual i Transsexual del Camp de Tarragona

 triangulo  
FUNDACIÓN TRIANGULO

 FUNDACIÓN LLAC

 bizkaisida 30 años  
Unión de personas con VIH

 afirmat

 QuieroPREVI

### Entes gubernamentales, coordinadoras, sociedades científicas:

 Dirección General de Salud Pública  
COORDINADORAS SANIDAD

 CESIDA  
Coordinadora estatal de VIH y sida

 seisida  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

### Otros colaboradores:

 panteres grogues  
BARCELONA

 MATINEE  
GRUPO