

PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA



UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS

**FORMACIÓN CONTINUADA
EN CODIFICACIÓN
RESPUESTAS AL TEST N° 4**

3ª ed. CIE-9-MC
1 de ENERO 1997

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 4.1: Gangrena diabética de pie derecho en paciente con claudicación intermitente debido a la diabetes.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 250.70** **Diabetes con trastornos circulatorios periféricos tipo II o de tipo no especificado, no indicada como descompensada**⁽¹⁾
- 443.81** *Angiopatía periférica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos*⁽²⁾
- 785.4** **Gangrena**⁽³⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 205 IE

Diabetes, diabético (congénita) (familiar) (mellitus)
(grave) (leve) (sin complicación) 250.0

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 250:

- 0 *Tipo II [no insulino-dependiente] [tipo DMNID] [inicio en adulto] o no especificado, no indicada como descompensada*
- 1 *Tipo I [insulino-dependiente] [tipo DMID] [tipo juvenil], no indicada como descompensada*
- 2 *Tipo II [no insulino-dependiente] [tipo DMNID] [inicio en adulto] o no especificado, descompensada*
- 3 *Tipo I [insulino-dependiente] [tipo DMID] [tipo juvenil], descompensada*

- gangrena 250.7 [785.4]

Observación: El el IE de la 3ª edición de la CIE-9-MC aparecen, por error tipográfico, mal especificados los quintos dígitos de la categoría 250, ya que figuran los quintos dígitos 3 y 4, cuando deberían figurar 2 y 3. Por si queda alguna duda, en la



página 167 de la lista tabular se encuentra la descripción correcta de estos quintos dígitos.

(2) Pág. 265 IE

Enfermedad (de), enfermo - véase además Síndrome
- vascular 459.9
- - periférica (oclusiva) 443.9
- - - en diabetes mellitus 250.7 [443.81]

Observación: Se ha acudido a la entrada “**Enfermedad**, vascular, periférica, en diabetes mellitus” ya que al ir al término principal **Claudicación, intermitente**, que es la patología vascular que aparece en la expresión diagnóstica, no figura el modificador esencial “debida a diabetes”. Además, tenemos la seguridad de seguir un camino correcto, ya que el código al que remitía la entrada **Claudicación, intermitente** (443.9), es el mismo al que nos lleva la entrada “**Enfermedad**, vascular, periférica” (443.9) antes del modificador esencial “en diabetes mellitus”.

(3) Pág. 339 IE

Gangrena, gangrenoso (anemia) (arteria) (celulitis)
(cutánea) (dermatitis) (éstasis) (húmeda) (infectiosa) (pénfigo) (seca) (séptica) (úlceras) 785.4
- diabética (cualquier sitio) 250.7 [785.4]

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 4.4
- Formación Continuada 7.9
- Pregunta a la Unidad 0.14
- Pregunta a la Unidad 8.4

FORMACIÓN CONTINUADA 4.2: Pancreatitis necrohemorrágica
y absceso peritoneal posoperatorio. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 577.0** Pancreatitis aguda⁽¹⁾
998.5 Infección postoperatoria⁽²⁾
567.2 Otras peritonitis supurativas⁽²⁾

ENTRADAS:

(1-a) Pág. 567 IE

Pancreatitis 577.0
- hemorrágica (aguda) 577.0

(1-b) Pág. 500 IE

Necrosis, necrótico
- páncreas (aséptica) (conducto) (grasa) 577.8
- - aguda 577.0

Observación: Dado que el IE en su entrada “**Necrosis, páncreas, aguda**” remite al mismo **577.0 Pancreatitis aguda** al que nos remitía “**Pancreatitis, hemorrágica (aguda)**”, no se empleará código adicional alguno para clasificar la pancreatitis necrohemorrágica.

(2-a) Pág. 8 IE

- Absceso** (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso)
(linfangítico) (metastásico) (múltiple) (piogénico)
(séptico) (*véase además* Celulitis) 682.9
- peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) 567.2
- - posoperatorio 998.5

(2-b) Pág. 126 IE

- Celulitis** (difusa) (con linfangitis) (*véase además* Absceso) 682.9
- retroperitoneal (*véase además* Peritonitis) 567.2

(2-c) Pág. 592 IE

- Peritonitis** (adherente) (aguda) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) 567.9
- bacteriana 567.2

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 7.2
- Formación Continuada 7.5
- Pregunta a la Unidad 1.10
- Pregunta a la Unidad 3.13
- Pregunta a la Unidad 6.7
- Pregunta a la Unidad 6.8

FORMACIÓN CONTINUADA 4.3: Trombosis vertebro-basilar,
persistiendo hemiplejía y ataxia al alta. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 433.30 Oclusión y estenosis de arterias precerebrales múltiple o bilateral, sin mención de infarto cerebral⁽¹⁾**
- 342.90 Hemiplejía no especificada, afectación de lado inespecificado⁽²⁾**
- 781.3 Falta de coordinación⁽³⁾**

ENTRADAS:

(1-a) Pág. 750 IE

- Trombosis, trombótico** (marásmica) (múltiple) (progresiva) (séptica) (vena) (vaso) 453.9
- arteria(s) (posinfecciosa) 444.9
 - - vertebral (*véase además* Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
 - - - con otra arteria precerebral 433.3

(1-b) Pág. 554 IE

Oclusión

- arteria(s) NCOC (*véase además* Embolia, arteria) 444.9
- - vertebral 433.2
- - - con otra arteria precerebral 433.3
- - - . . .

Observación: No se ha acudido a la entrada **Embolia**, arteria, a la que nos remite la referencia cruzada "*véase además*", ya que no se correspondía con el concepto Trombosis que era el origen de la búsqueda.



(2) Pág. 358 IE

Hemiplejia 342.9

-

(3) Pág. 78 IE

Ataxia, atáxica 781.3

-

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 2.5
- Formación Continuada 3.1
- Pregunta a la Unidad 5.10
- Pregunta a la Unidad 6.14
- Pregunta a la Unidad 6.18

FORMACIÓN CONTINUADA 4.4: ATP realizada por radiología vascular intervencionista en pacientes con isquemia de extremidades inferiores. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 443.9** Enfermedad vascular periférica no especificada⁽¹⁾
39.50 Angioplastia o aterectomía de vasos no coronarios con prótesis (“stent”)(s) o injerto/s protésico/s⁽²⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 265 IE

Enfermedad (de), enfermo - véase además Síndrome

- vascular 459.9
- - periférica (oclusiva) 443.9
- - - . . .

Observación: No se ha acudido al término principal **Síndrome** al que nos remite la referencia cruzada “véase además”, ya que no aparece en él el modificador esencial “- vascular”.

(2-a) Pág. 342 IP

Angioplastia (láser) - véase además Reparación, vaso sanguíneo

- transluminal percutánea (balón) (un solo vaso) (con stent) (con stent injertado) 39.50
- - extremidad
- - - inferior NCOC 39.50
- - - . . .



(2-b) Pág. 488 IP

Reparación

- vaso sanguíneo NCOC 39.59
- - periférico NCOC 39.59
- - - por angioplastia 39.50
- - - . . .

Observación: Por un error de imprenta, en la página 488 del IP figura “- - - por angioplastia” como modificador esencial de la entrada “**Reparación**, vaso sanguíneo, periférico, cuando debería figurar “- - - por angioplastia”.

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 2.8
- Formación Continuada 4.1
- Formación Continuada 5.2
- Pregunta a la Unidad 4.8

FORMACIÓN CONTINUADA 4.5: Infección urinaria en paciente portador de sonda permanente.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

599.0 Infección de tracto urinario, sitio no especificado⁽¹⁾

V47.4 Otros problemas urinarios⁽²⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 421 IE

Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9

- urinaria (tracto) NCOC 599.0

-- ...

(2) Pág. 613 IE

Problema (de) (con) V49.9

- urinario NCOC V47.4

Observación: La CIE-9-MC no dispone de un código específico para clasificar a un paciente como portador de sonda urinaria, sin embargo se permite el uso opcional del **V47.4 Otros problemas urinarios** en el caso de que sea importante para la institución la recuperación de este tipo de pacientes.

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 5.3
- Formación Continuada 7.5
- Pregunta a la Unidad 1.10
- Pregunta a la Unidad 2.6
- Pregunta a la Unidad 3.13
- Pregunta a la Unidad 6.7
- Pregunta a la Unidad 6.9

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 4.6: Depresión neurológica debido a anestesia en recién nacido prematuro intervenido de imperforación anal con anorectoplastia. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 751.2** Atresia y estenosis de intestino grueso, recto y canal anal⁽¹⁾
- 765.10** Otros niños nacidos antes de término, peso no especificado⁽²⁾
- 779.1** Otra irritabilidad cerebral e irritabilidad cerebral no especificada del recién nacido⁽³⁾
- E938.4** Efecto adverso por uso terapéutico de otros anestésicos generales y anestésicos generales no especificados⁽⁴⁾
- 49.79** Otra reparación de esfínter anal⁽⁵⁾
- 48.79** Otra reparación de recto⁽⁶⁾

ENTRADAS:

(1-a) Pág. 406 IE

Imperforación (congénita) - véase además Atresia
- ano 751.2

(1-b) Pág. 79 IE

Atresia, atrésico (congénita) 759.8
- ano, anal (canal) 751.2

(2) Pág. 610 IE

Prematuro - véase además enfermedad específica
- niño NCOC 765.1



- - . . .

(3) Pág. 437 IE

Irritabilidad (nerviosa) 799.2
- cerebral, recién nacido 779.1

(4) Pág. 795 TFSQ

Anestesia, anestésico (general) NCOC. E938.4
[3ª columna = Uso terapéutico]

(5) Pág. 342 IP

Anoplastia 49.79
- . . .

(6) Pág. 477 IP

Rectoplastia 48.79

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 1.7
- Formación Continuada 5.10
- Pregunta a la Unidad 0.1
- Pregunta a la Unidad 0.13
- Pregunta a la Unidad 1.4
- Pregunta a la Unidad 2.10
- Pregunta a la Unidad 3.7
- Pregunta a la Unidad 6.3
- Pregunta a la Unidad 6.21
- Pregunta a la Unidad 7.4

FORMACIÓN CONTINUADA 4.7: Coma por sobredosis de heroína en paciente ADVP consumidor de un gramo diario. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 965.01 Envenenamiento por heroína**⁽¹⁾
- 780.01 Coma**⁽²⁾
- E850.0 Envenenamiento accidental por heroína**⁽³⁾
- 304.0 Dependencia de drogas de tipo opiode, continua**⁽⁴⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 837 TFSQ

Heroína 965.01
[1ª columna = Envenenamiento]

(2) Pág. 141 IE

Coma 780.01
- . . .

(3) Pág. 837 TFSQ

Heroína E850.0
[2ª columna = Accidente]

(4-a) Pág. 22 IE

Adicción - véase además Dependencia
- heroína 304.0



(4-b) Pág. 188 IE

Dependencia (a)

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 304:

- 0 sin especificar*
- 1 continua*
- 2 episódico*
- 3 en vías de remisión*

- heroína 304.0

- - - . . .

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 1.10
- Formación Continuada 3.4
- Pregunta a la Unidad 0.10
- Pregunta a la Unidad 0.13
- Pregunta a la Unidad 0.14
- Pregunta a la Unidad 5.8
- Pregunta a la Unidad 5.9
- Pregunta a la Unidad 6.8
- Pregunta a la Unidad 6.20
- Pregunta a la Unidad 8.8

FORMACIÓN CONTINUADA 4.8: Insuficiencia renal como consecuencia de un aborto tratado en un ingreso anterior.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

639.3 Fallo renal después de aborto o de embarazo ectópico o molar⁽¹⁾

ENTRADAS:

⁽¹⁾ Pág. 304 IE

Fallo, fallido

- renal 586
- después de
- aborto 639.3
- . . .

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 6.9

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 4.9: Parada cardiaca posoperatoria que se recupera con masaje cardiaco.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 997.1 Complicaciones cardiacas⁽¹⁾**
427.5 Paro cardiaco⁽¹⁾
99.63 Masaje cardiaco a tórax cerrado⁽²⁾

ENTRADAS:

⁽¹⁾ Pág. 576 IE

Paro, parado, detención, detenido

- cardiaco 427.5
- - cuando complica
- - - cirugía (no terapéutico) (terapéutico) 997.1
- - posoperatorio (inmediato) 997.1

Observación: Dado que el descriptor del código **997.1 Complicaciones cardiacas** no especifica el tipo de complicación cardiaca de la que se trata, si el codificador dispone de información que la documente, debe emplear un código adicional para clasificarla; en este caso el **427.5 Paro cardiaco**.

⁽²⁾ Pág. 446 IP

Masaje

- cardiaco (externo) (manual) (cerrado) 99.63
- - - -

Fichas relacionadas:

- Pregunta a la Unidad 8.6

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA



FORMACIÓN CONTINUADA 4.10: Esofagitis en paciente diagnosticado de reflujo esofágico. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

530.11 Esofagitis por reflujo⁽¹⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 281 IE

Esofagitis (aguda) (alcalina) (crónica) (infecciosa) (ne-crónica) (péptica) (posoperatoria) (química) (re-gurgitante) 530.10

- por reflujo 530.11

- . . .

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 3.3

- Formación Continuada 4.10