

Sociedad Española Oncología Radioterápica

RECOMIENDA:

- 1 En cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPNCP) en estadios iniciales no candidatos a cirugía, no se recomiendan fraccionamientos convencionales.
- 2 No realizar radioterapia postoperatoria de forma rutinaria en pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) en estadio inicial (N0-N1) con márgenes negativos.
- 3 No hacer Radioterapia adyuvante en astrocitoma / oligodendrogliomas supratentoriales de bajo grado en adultos con resección completa sin criterios de alto riesgo.
- 4 No indicar radioterapia de rescate tras Prostatectomía y PSA > 2 ng/ml sin realizar pruebas de imagen que determinen la localización de la recidiva.
- 5 No considerar rutinariamente esquemas de fraccionamiento largos (>10 sesiones) para el tratamiento paliativo de las metástasis óseas.

Estas recomendaciones se enmarcan en el proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España, coordinado por el **Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, GuíaSalud** y la **Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)**.



La información sobre el proyecto está disponible en:

http://10.15.5.20:8162/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal_sssc.htm