

SARNA O ESCABIOSIS




ETIOLOGÍA

Infestación parasitaria causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei*, var. *hominis*, el cual se introduce en la piel y pone huevos, causando lesiones.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Está presente en todo el mundo, aunque es más frecuente en los países tropicales cálidos y en las zonas con alta densidad de población y pocos recursos. En España, hay un aumento de la incidencia en los últimos años.



SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas suelen empezar entre 4 y 6 semanas después de la infestación, variando según el grado y duración de la infestación y la situación inmunológica de la persona.

Incluye picor intenso y lesiones característicos en la piel (surcos acarinos, vesículas y nódulos).

FORMA DE TRANSMISIÓN

La sarna suele transmitirse a través del contacto directo con la piel de una persona o animal infestado o, menos común, teniendo contacto con artículos infestados. El riesgo de contagio aumenta con el grado de infestación, por lo que es mayor si la persona tiene sarna costrosa.



RECOMENDACIONES/CONSEJOS



- Evitar el contacto directo con una persona, animal o material infestado.
- Ante una persona infestada, tratar a todos los miembros de la familia y desinfestar los objetos y las habitaciones con las que haya tenido contacto para evitar la propagación de la infestación.