

## 6. USUARIOS DE PROSTITUCIÓN MASCULINA

En 2003, la Asociación Stop sida y la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida realizaron un estudio, el "cuidate.info", con el objeto de recoger información relativa a las conductas sexuales de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que permitiera mejorar los abordajes y los mensajes preventivos a utilizar en ediciones posteriores de la campaña "Cúdate"<sup>13</sup> [21].

Se presentan algunos datos relativos a 71 hombres que pagaron por los servicios sexuales que les prestaron otros hombres.

### Características sociodemográficas

El 8,4% (71) de los participantes en el proyecto cuidate.info refirieron haber pagado para mantener relaciones sexuales con otros hombres. De ellos, el 94,3% era residente en España: el 38,6% en Barcelona, el 21,4% en Madrid, el 15,7% en Valencia y el 18,6% en otras provincias. El 17,1% tenía un país de origen distinto a España. El 38,6% vive solo y el 55,1% refiere haber completado estudios universitarios.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (%)	
<b>EDAD (%)</b>	
Menor de 20	
20-29	17,1
30-39	48,6
40-49	25,7
Mayor 49	8,6
<b>NIVEL DE ESTUDIOS (%)</b>	
Primarios	13
Secundarios	31,9
Universitarios	55,1
<b>CONVIVENCIA (%)</b>	
Solo	38,6
Con pareja masculina	27,1
Con pareja femenina	5,7
Con padres o parientes	18,6
Con amigos	10,0

El 64,8% se declara frecuentador (más de una vez a la semana) de lugares de ambiente gay siendo los bares (86,5%), las discotecas (75,4%), las saunas (59,7%), los lugares de cruising (35,4%) y los lavabos públicos (34,8%) los más visitados. En definitiva, el 76,1% acudía a lugares de ambiente gay donde la práctica de sexo podría ser posible.

<sup>13</sup> Campaña nacional de prevención del VIH/sida iniciada en 1994 y dirigida al colectivo homosexual

<b>LUGARES DE AMBIENTE GAY</b>			
<b>Frecuentación de lugares de ambiente gay</b>		<b>Acude a bares</b>	
Nunca en el último año	4,2	No	7,5
Menos de una vez al mes	31	En mi ciudad no hay	6
De 2 a 3 veces al mes o aproximadamente		Una vez al mes o menos	35,8
1 vez a la semana	45,1	Más de una vez al mes	50,7
Más de una vez a la semana pero no cada día	15,5		
Casi cada día	4,2		
		<b>Acude a lugares cruising</b>	
<b>Acude a librerías</b>		No	43,9
No	29,2	En mi ciudad no hay	3
En mi ciudad no hay	15,4	Una vez al mes o menos	33,3
Una vez al mes o menos	46,2	Más de una vez al mes	19,7
Más de una vez al mes	9,2		
		<b>Acude a lavabos públicos</b>	
<b>Acude a gimnasios</b>		No	61,5
No	75	En mi ciudad no hay	3,1
En mi ciudad no hay	12,5	Una vez al mes o menos	24,6
Una vez al mes o menos	3,1	Más de una vez al mes	10,8
Más de una vez al mes	9,4		
		<b>Acude a saunas</b>	
<b>Acude a discotecas</b>		No	31,3
No	18,5	En mi ciudad no hay	9
En mi ciudad no hay	6,2	Una vez al mes o menos	35,8
Una vez al mes o menos	38,5	Más de una vez al mes	23,9
Más de una vez al mes	36,9		

### Conocimientos sobre el sexo y el VIH

Entre el 69% y el 98,6% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales refirió conocer distintas afirmaciones relacionadas con las prácticas sexuales y la infección por el VIH.

La afirmación más conocida (98,6%) fue "Los hombres pueden protegerse a sí mismos utilizando un condón correctamente cada vez que tienen sexo anal, tanto cuando penetran como si son penetrados" y la menos conocida (69%) "Puedes acudir a un Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual de forma gratuita y sin necesitar la cartilla de la Seguridad Social"

<b>CONOCIMIENTO SOBRE EL SEXO Y EL VIH (%)</b>	
<b>Saben las siguientes afirmaciones</b>	
1. Es posible tener una infección de transmisión sexual y no mostrar signos ni síntomas	93
2. Un hombre VIH negativo es más fácil que pueda infectarse por el VIH si es penetrado analmente por un hombre VIH positivo que si él penetra a un hombre VIH positivo	71,8
3. Incluso si no eyacula en el ano, un hombre VIH positivo puede pasar la infección por el VIH penetrando analmente a un hombre VIH negativo	71,8
4. Los hombres pueden protegerse a sí mismos utilizando un condón correctamente cada vez que tienen sexo anal, tanto cuando penetran como si son penetrados	98,6

5. Existe la posibilidad de realizarse una prueba anónima para averiguar si estás infectado por el VIH	80,3
6. Puedes acudir a un Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual de forma gratuita y sin necesitar la cartilla de la Seguridad Social	69
7. Es más difícil que se rompan los condones si se usan con un lubricante hidrosoluble (a base de agua)	83,1
8. Indicador ONUSIDA (conocimiento de las 3 frases: 2, 3 y 4 )	52,1

### Prueba del VIH/sida

El 82,9% de los hombres que refirió haber pagado por mantener relaciones sexuales con otros hombres se había realizado la prueba del VIH/sida y recogido el resultado de la misma. De ellos, el 13,6% se declaró VIH positivo. El 64% de los que se declararon VIH negativos (86,4%) refirió que este resultado lo recibió en el último año.

Los principales lugares para la realización de la última prueba del VIH/sida fueron los centros de ETS (27,1%) y laboratorios privados (23,7%). Sólo el 27,1% manifestó haber recibido consejo asistido antes y después de la realización de la misma.

PRUEBA DEL VIH/SIDA (%)	
<b>¿En alguna ocasión has recibido un resultado de la prueba del VIH/sida?</b>	
Sí, una vez	25,7
Sí, varias veces	57,1
Me he hecho la prueba pero no recogí el resultado	0
No, nunca me he hecho la prueba del sida	17,1
<b>Resultado de la prueba del VIH/sida más reciente</b>	
Negativo	86,4
Positivo	13,6
<b>¿El diagnóstico negativo fue en el último año?</b>	
Sí	64
No	36
<b>¿Dónde te realizaste la última prueba del VIH/sida?</b>	
En la consulta de mi médico de cabecera	20,3
En un Centro de ETS	27,1
En un hospital	20,3
En un laboratorio privado	23,7
En otro sitio	3,4
En una ONG antisida u homosexual	5,1
<b>¿Recibiste consejo asistido?</b>	
Sí, antes y después de realizármela	27,1
Sí, pero sólo antes de realizármela	8,5
Sí, pero sólo después de realizármela	11,9
No	52,5

### Motivos para no realizarse la prueba del VIH/sida

Las doce personas que no se habían realizado la prueba del VIH adujeron como principales razones para ello: me asusta la posibilidad de recibir un resultado positivo (41,7%); tomo medidas de precaución y eso no depende de saber si estoy o no infectado (41,7%); me podrían discriminar si resultase VIH positivo (33,4%); estoy bastante seguro de que soy negativo (25%) o alguna vez he pensado hacérmela pero no sé dónde (25%).

### Acerca de las parejas sexuales

El 40,8% de los participantes que pagaron por mantener relaciones sexuales con otros hombres refirió tener pareja estable masculina: el 89,3% de ellos una sola pareja estable, el 7,1% dos y el 3,6% tres parejas estables. El 44,8% refirió que su estado serológico con respecto al VIH y el de su pareja estable eran coincidentes.

PAREJA ESTABLE MASCULINA (%)			
<b>Actualmente, ¿tienes pareja estable masculina?</b>		<b>¿Cuántas parejas estables masculinas?</b>	
Sí	40,8	Una	89,3
No	59,2	Dos	7,1
		Tres	3,6
<b>¿Tú y tu pareja estable tenéis el mismo resultado de la prueba del VIH/sida?</b>			
Sí, ambos tenemos el mismo resultado (los dos somos positivos o los dos somos negativos)		44,8	
No, uno de nosotros es positivo y el otro negativo		17,2	
No sé si tenemos el mismo resultado		37,9	

### Relaciones sexuales en los últimos 12 meses

El 85,9% de los participantes que pagaron por servicios sexuales refirió haber tenido, en los últimos 12 meses, relaciones sexuales sólo con hombres. De ellos, el 96,8% tuvo relaciones sexuales con dos o más hombres diferentes.

Las prácticas sexuales "sexo oral sin eyaculación", "penetrar analmente con condón" y "haber sido penetrado analmente con condón" fueron más frecuentes con las parejas ocasionales que con la estable.

RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)			
<b>¿Has tenido relaciones sexuales?</b>		<b>¿Con cuántos hombres diferentes?</b>	
No he tenido relaciones sexuales	0	Uno	1,4
He tenido relaciones sexuales sólo con mujeres	0	2-4	8,5
He tenido relaciones sexuales sólo con hombres	85,9	5-12	35,2
He tenido relaciones sexuales con hombres y con mujeres	14,1	13-29	26,8
		Más de 29	28,2
<b>Tipo de práctica sexual</b>			
	<b>Con pareja estable</b>	<b>Con relaciones ocasionales</b>	
Sexo oral sin eyaculación	68,7	94,2	
Sexo oral con eyaculación	35,3	34,8	
Has sido penetrado analmente con condón	49,3	66,2	
Has sido penetrado analmente sin condón	25,8	20,6	
Has realizado la penetración anal con condón	54,5	78,3	
Has realizado la penetración anal sin condón	33,3	29,4	

### Penetración anal

#### Con condón

El 94,4% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con otros hombres refirió haber practicado la penetración anal (penetrar o haber sido penetrado) en alguna ocasión durante los 12 meses precedentes al estudio. El 92,5% de ellos manifestó que fue con dos o más hombres diferentes. El 82,1% declaró haber penetrado con condón a otro hombre en alguna ocasión referido a los últimos doce meses y el 85,7% manifestó haber usado el condón en la última penetración anal (penetrar o haber sido penetrado).

#### Sin condón

El 56,7% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales refirió que, en los últimos doce meses, había penetrado o había sido penetrado analmente sin con-

dón por otro hombre. De ellos: el 47,4% manifestó que fue con dos o más hombres diferentes, el 33,5% refirió que únicamente en una ocasión fue con un solo hombre y el 60,5% declaró que no sabía el estado serológico con respecto al VIH de ninguno de los hombres con los que realizó la penetración anal sin condón.

<b>PENETRACIÓN ANAL (%)</b>			
		<b>SIN CONDÓN</b>	
<b>En los últimos 12 meses, ¿en alguna ocasión has practicado la penetración anal con un hombre?</b>		<b>En los últimos 12 meses, ¿has penetrado tú o has sido penetrado analmente sin condón?</b>	
No	5,6	No	43,3
Sí	94,4	Sí	56,7
		<b>¿Con cuántos hombres diferentes?</b>	
Uno	7,5	Uno	52,6
2-4	22,4	2-4	23,7
5-12	41,8	5-12	13,1
13-29	17,9	13-29	5,2
Más de 29	10,4	Más de 29	5,2
		<b>¿Con cuántos de ellos fue solamente en una ocasión?</b>	
<b>En los últimos 12 meses, ¿en alguna ocasión has penetrado analmente a otro hombre con condón?</b>		Ninguno	18,4
No	17,9	Uno	39,5
Sí	82,1	2-4	23,7
		5-12	10,5
		13-29	2,6
		Más de 29	5,2
<b>¿Utilizaste condón en la última penetración anal? (tanto penetrar como ser penetrado)</b>		<b>¿De cuántos de ellos sabías que tenían tu mismo estado serológico con respecto al VIH?</b>	
No	14,3	Ninguno	60,5
Sí	85,7	uno	26,3
		2-4	7,9
		5-12	2,6
		13-29	2,6
		Más de 29	0

### **Rotura del preservativo**

El 27,3% de los que pagaron por mantener relaciones sexuales con otros hombres manifestó que, en los últimos doce meses, se le había roto el condón en alguna ocasión contribuyendo fundamentalmente a tal situación el no utilizar lubricante para la penetración anal y el uso de saliva como lubricante.

<b>ROTURA DEL PRESERVATIVO (%)</b>			
		<b>Situaciones que han contribuido a la rotura del condón</b>	
<b>En los últimos 12 meses, en alguna ocasión, ¿se te ha roto el condón?</b>			
No, nunca	72,7	Realizar la penetración durante más de media hora sin cambiar el condón	20
Sí, una vez	16,4	No usar lubricante	40
Sí, dos veces	7,3	Usar saliva como lubricante	40
Sí, más de dos veces	3,6	No quitar el aire de la punta del condón	20
		Desenrollar el condón antes de ponerlo	20
		Usar como lubricante cremas y sustancias grasas	33,4
		No usar un condón adecuado para la penetración anal	20
		Abrir el envoltorio con los dientes	26,7

### **Consumo de sustancias antes o durante las relaciones sexuales**

El 32,4% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con otros hombres refirió no consumir sustancia alguna antes o durante sus relaciones sexuales. Entre los que sí lo hacían, el alcohol (56,3%), los poppers (29,6%) y la cocaína (29,6%) fueron las sustancias más consumidas. En el Anexo 2 figuran los efectos asociados al consumo de diversas drogas.

### **Infecciones de transmisión sexual**

El 83,1% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales refirió que, en los últimos doce meses, no había sido diagnosticado de una ITS. Entre los que manifestaron que habían sido diagnosticados de alguna ITS, la gonorrea y la sífilis fueron las más frecuentes.

### **Información sobre temas relacionados con el VIH/sida**

Los participantes en el estudio que pagaron por mantener relaciones sexuales con hombres manifestaron querer recibir información sobre diferentes temas referidos a las relaciones sexuales y la prevención del VIH/sida. El mayor interés se centró en cómo practicar la felación con seguridad (54,9%), la profilaxis post-exposición al VIH (49,3%) y cómo sentirse confiado en las relaciones sexuales (42,3%).

<b>TEMAS SOBRE LOS QUE LOS HSH QUIEREN MÁS INFORMACIÓN (%)</b>	
Cómo practicar la felación con seguridad	54,9
Qué es la Profilaxis Post-Exposición al VIH	49,3
Cómo sentirme confiado en las relaciones sexuales	42,3
Cómo practicar la penetración anal con seguridad	36,6
Dónde encontrar parejas sexuales ocasionales	35,2
Cómo evitar que los condones se rompan	32,4
Transmisión, diagnóstico y tratamiento de la sífilis y/o la gonorrea	29,6
Transmisión, diagnóstico, vacunación y tratamiento de las hepatitis A, B y C	29,6
Que distintos tipos de condones se pueden adquirir	28,2
Cuáles son los tratamientos para la infección por el VIH	28,2
Cómo hablar sobre las relaciones sexuales con una pareja estable	23,9

Sexo más seguro para hombres VIH positivos	21,1
Cuándo, cómo, por qué y dónde realizarme la prueba del VIH	19,7
Qué puedo hacer si no quiero usar preservativo con mi pareja estable	19,7
Cómo hablar de mi seropositividad al VIH con mis contactos sexuales o parejas	19,7
Cómo negociar el uso del preservativo con un contacto sexual, un ligue	16,9
Otros	1,4