

Informe día 03/08/12

Hora: 13.30

Brote de Fiebre Hemorrágica por virus Ébola en Uganda.

Fuente de información: Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de Uganda y prensa.

El 28.07.2012, el Ministerio de Sanidad de Uganda confirmó un brote de Fiebre hemorrágica por Ébola en el distrito de Kibaale en la parte occidental del país (Figura).


Según la información a 1 de agosto, se han producido 38 casos, incluidas 16 muertes. Los resultados de laboratorio realizados en el *Laboratorio de Investigación de Virus de Uganda* han confirmado la presencia de virus de Ebola Sudán en cinco personas.

El Ministerio de Sanidad de Uganda, ha confirmado un solo caso en Kampala, un sanitario que tuvo contacto con enfermos en el distrito de Kibaale, que se trató en la capital y finalmente murió.

Los casos sospechosos, probables y confirmados están siendo tratados y aislados temporalmente en las salas de hospitalización de los Hospitales de Kagadi en Kibaale y Mulago en Kampala (cuarentena de los ocho contactos del caso tratado en Kampala).

El Ministerio de Salud de Uganda continúa trabajando con múltiples actores en el control del brote. Se ha movilizó un equipo de expertos nacionales e internacionales del M^o, del hospital de Mulago, OMS, CDC y ONGs especializadas para implementar estrategias de control y apoyar la respuesta en el terreno.

Las actividades de control incluyen la búsqueda activa de casos, la identificación y seguimiento de los contactos, el aumento de la vigilancia epidemiológica así como el refuerzo de las prácticas de control de la infección, el manejo de casos, la movilización social y la coordinación.



Evaluación del riesgo:

Hasta la fecha, todos los casos identificados se infectaron en el distrito de Kibaale. Si bien en diversas fuentes informales se rumorea sobre posibles casos adicionales en dos distritos vecinos y en la capital, así como en la vecina Kenia, esta información no ha podido ser verificada, por lo que, **por el momento, se considera que el riesgo de infección se circunscribe al distrito de Kibalee, en Uganda.**

Por otro lado, Uganda ya ha experimentado en el pasado brotes similares en distritos cercanos al actual, por lo que **se cuenta con experiencia en el país para la gestión de este tipo de brotes** con el apoyo actual de la OMS, CDC y otros actores.

Dado que el periodo de incubación de la Fiebre Hemorrágica por Ébola puede ser hasta de tres semanas, es posible que se identifiquen nuevos casos en las próximas semanas a pesar de las medidas tomadas.

Recomendaciones:

- El **riesgo para viajeros a Uganda es muy bajo** fuera del distrito afectado. Sin embargo, siempre deben **extremarse las medidas de higiene y evitar el contacto** con fluidos corporales de **personas y/o animales enfermos o muertos.**

- En el caso de que llegara algún viajero infectado procedente de Uganda durante su período de incubación, la infección obligaría a buscar atención médica y se procedería a su aislamiento, **por lo que el riesgo de diseminación posterior de la infección en España es prácticamente nulo** y restringido a los contactos estrechos del paciente.